

Số: 26/TB-UBND

Minh Tiến, ngày 10 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ
hại lúa xuân năm 2024

Kính gửi: - **Trưởng các đoàn thể;**
- **Cán bộ khuyến nông viên;**
- **Công chức văn hóa xã;**
- **Trưởng các thôn.**

Căn cứ vào tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng và kết quả kiểm tra đồng ruộng của khuyến nông về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân năm 2024 UBND xã Minh Tiến thông báo: Hiện nay trên lúa xuân thời kỳ hồi xanh - đẻ nhánh xuất hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại chủ yếu sau:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Xuất hiện và gây hại trên đồng ruộng, mật độ trung bình 5-10 con/m², phổ biến tuổi 1-2.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại trên các giống lúa, mật độ trung bình 10-15 con/khóm, cao 15 - 25 con/khóm.

Dự báo trong điều kiện thời tiết âm u, mưa rào như hiện nay rất thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh hại phát sinh phát triển và gây hại trên diện rộng. Để phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên đạt hiệu quả, hạn chế thiệt hại về năng suất lúa vụ xuân. UBND xã Minh Tiến yêu cầu các ban ngành đoàn thể, trưởng các thôn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Cán bộ khuyến nông viên, Trưởng các thôn.

Cán bộ khuyến nông viên phối hợp với trưởng các thôn tăng cường công tác kiểm tra thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu, rầy hại kịp thời. Đồng thời khuyến cáo bà con nông dân phun thuốc đúng thời điểm. Khi đã phòng trừ sâu, rầy xong, khuyến nông viên hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc để cây lúa sớm phục hồi và phát triển đảm bảo nguồn nước tưới đầy đủ tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, tăng sức chống chịu với các đối tượng sâu hại, bệnh hại. Kịp thời phát hiện dịch hại và tiến hành các biện pháp phòng trừ sau:

a) Đối với sâu cuốn lá nhỏ:

- Dùng đèn bẫy bướm để tiêu diệt bướm cuốn lá nhỏ, kết hợp diệt bướm sâu đục thân, thời gian đặt đèn từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

- Khi sâu non mật độ từ 10- 15 con/m², sử dụng một trong các loại thuốc sau: Reasgant 3.6EC, Tasieu 5WG, Emasuper 5WP, Bemab 40WG, Bemab 52WG...phun khi sâu non tuổi nhỏ. Nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì, phun 20-30 lít nước thuốc pha cho 1 sào (360m²), nên phun vào buổi chiều mát.

b) Rầy nâu, rầy lưng trắng:

-Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm, kịp thời

- Mật độ rầy từ 15-20 con/khóm lúa, sử dụng một trong các loại thuốc như: Bassa 50EC, Actara 25 WG, NOMIDA 10WP, Quilux 25 EC, Chesone 300 WP..... nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì, phun 30 - 40 lít nước thuốc đã pha/ sào 360 m²,

2. Công chức văn hóa xã

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa vụ xuân và biện pháp phòng trừ để nhân dân biết chủ động phòng trừ.

Trên đây là chỉ đạo của UBND xã Minh Tiến về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa vụ xuân trên địa bàn xã. Đề nghị cán bộ khuyến nông viên xã, trưởng các thôn, các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã;
- Lưu vp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quý

